

診断受け、適切な対処を

ものもらいは、炎症などでまぶたが腫れ上がる病気。まぶたにうみがたまる「麦粒腫(ばくりゆうしゅ)」と、脂がたまる「霰粒腫(さんりゆうしゅ)」の2種類がある。見た目は似ているが治療法は全く異なるため、きちんと診断を受けた上で、適切に対処することが重要だ。伊藤医院(さいたま市)の有田玲子医師に、治療法や生活上の注意点について聞いた。

▽細菌に感染

麦粒腫は細菌の感染が原因。まぶたが化膿(かのう)して赤く腫れ、痛みが生じる。「感染が原因といつても人にうつることはなく、適切に対処すれば長引くことはありません」と有田医師。抗生素質の点滴や眼軟こうの塗布によつて炎症を抑える治療がメインで、通常は1週間から10程度で軽快していく。眼帯は、菌の繁殖を促すため使用しな


原因異なる

二つのものもらい

麦粒腫



霰粒腫



自己判断は禁物！何かできたらすぐに眼科受診を

再発を繰り返す場合は、免疫力が低下している恐れがある。「よくあるのが、花粉症

い。

とものもらいを併発するケース。アレルギーによる免疫力低下が原因です」と有田医師。「そもそも麦粒腫は、体のあちこちに存在しているブドウ球菌が主な原因。体が弱っていると、普段は人の健康を脅かすことのない細菌にまで感染してしまうのです。大切なのは、まぶたを清潔に保ち、疲労やストレスをためないことが重要です。

▽脂が詰まる

一方、脂を分泌するマイボーム腺が詰まる霰粒腫は治療が長引く傾向があり、治るまでに数ヶ月を要することが多い。基本的に痛みはないが、冷えによる血行不良や食事で油を大量に摂取した影響などで細菌感染を合併した「化膿性霰粒腫」になると、痛みが生じる。

目薬では治せず、手術という選択肢もあるが、最近ではまぶたを温めて詰まつた油を溶かす「温あん法」が主流。

問題は、霰粒腫がドライアイのリスクを高めてしまうこと

と。「マイボーム腺から分泌される脂には、涙の蒸発を防ぐ作用があります。ところが、霰粒腫を繰り返すとマイボーム腺の機能が低下し、潤いに必要な油が不足してしまいます」

いずれのものもらいも、予防にはまぶたを洗うことと、温あん法が有効だ。有田医師は「特に雑菌の多いまぶたの際(きわ)を、朝晩しつかり洗う」と。アイメークは、マイボーム腺をふさいでしまうのでお勧めできません。温あん法は血流を促してくれますが、炎症を起こしているときは控えましょう」とアドバイスしている。具体的には、I M E 研究会のホームページ(<http://www.ime.jp>)が参考になる。(メディカルトリビューン)

時事

◇ ◇

伊藤医院の所在地は、〒3

37-0042 さいたま市見沼区南中野626の11 電

話048(686)55588